

酮康唑联合克霉唑栓治疗老年念珠菌性阴道炎的价值分析与探究

周沛瑶

(成都市第二人民医院 四川 成都 610011)

[摘要]目的:探讨酮康唑联合克霉唑栓在治疗老年念珠菌性阴道炎中的效果。方法:选取时间2020年7月-2021年7月之间在我院进行治疗的老年念珠菌性阴道炎病患进行研究分组,按随机数字表法进行分组,分别为参照组33例和实验组33例,共有病患66例。参照组使用酮康唑治疗,实验组在参照组基础上联合克霉唑栓。对比老年念珠菌性阴道炎病患的治疗结果。结果:实验组症状缓解时间短于参照组,数据对比存在差异($P < 0.05$);实验组病患治愈率高于参照组病患的治愈率,数据之间具有对比意义($P < 0.05$)。结论:克霉唑栓与酮康唑联合使用的治疗效果更好,能快速缓解病患的病情,治疗效果值得推广和应用。

[关键词]老年念珠菌性阴道炎;酮康唑;克霉唑栓;价值

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.06.822

老年念珠菌性阴道炎是目前临床中比较常见的妇科疾病。随着近年来女性疾病率的攀升,患有老年念珠菌性阴道炎的病患越来越多。老年念珠菌性阴道炎是阴道炎的一种。其主要临床表现症状为白带异常,外阴瘙痒,外阴灼痛。并且老年念珠菌性阴道炎具有反复发作的临床特点,对女性的生活造成一定影响。老年念珠菌性阴道炎的发生与女性生活习惯,病原体,卫生等都存在一定关联。目前临床多采用药物对其进行治疗。常用药物为克霉唑栓与酮康唑,联合用药效果显著。为了验证其临床价值,本次选取我院收治的老年念珠菌性阴道炎病患进行研究分析,具体情况如下。

1 资料与方法

1.1 基础资料

我院选取的66例老年念珠菌性阴道炎病患均选取2020年7月到2021年7月期间,分为参照组、实验组,各33例。参照组年龄在55岁-88岁之间,平均年龄为(73.34±3.25)岁;实验组年龄在56岁-89岁之间,年龄平均为(73.63±3.33)岁。病患资料对比结果显示数据不具有统计意义($P > 0.05$)。参选患者均为在我院治疗的念珠菌性阴道炎患者,并且患者的年龄在55周岁以上。参选患者无其他重大疾病,无意识障碍,对本次使用的药物认同,并且无过敏史。参选患者均签署知情通知书。

1.2 研究方法

参照组应用酮康唑:生产厂家:西安杨森制药有限公司,准字批号:国药准字H20043171, [规格型号] 15g,用法用量:局部外用,取本品适量涂于患处,每日1~2次。

实验组在参照组基础上进行克霉唑栓治疗,克霉唑栓:(生产厂家:广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂,准字批号:国药准字H44023467, 0.15g*10枚(白云山)),用法用量:清洗外阴后,将本品放入阴道深部,每晚一次,每次一粒,连用七天为一疗程。

1.3 指标观察和分析

1.3.1 比较实验组、参照组病患的症状缓解时间。临床症状包括:阴道充血、外阴瘙痒、阴道坠痛。

1.3.2 对比实验组、参照组病患的治疗结果。治疗有效率=总例数/(显效+有效)×100%。

1.4 统计学方式

用统计学软件SPSS17.0对数据进行计算,百分率%表示时, χ^2 检验;(x±s)表示时,T检验,当 $P < 0.05$ 时,差异存在可比性。

2 结果

2.1 临床症状缓解时间比较

实验组临床症状缓解时间(阴道充血、外阴瘙痒、阴道坠痛)短于参照组阴道充血、外阴瘙痒、阴道坠痛时间,数据对比有差异($P < 0.05$),见表1。

表1 实验组、参照组病患症状缓解时间对比(x±s, d)

组别	例数	阴道充血	外阴瘙痒	阴道坠痛
实验组	33	4.55±1.37	4.26±1.13	5.52±1.59
参照组	33	7.21±1.33	6.61±1.17	7.82±1.24
T		8.0028	8.2994	6.5527
P		0.0000	0.0000	0.0000

2.2 治疗有效率比较

实验组病患的治疗结果高于参照组,差异存在统计意义($P < 0.05$),见表2。

表2 实验组、参照组病患治疗有效率对比(n, %)

组别	例数	显效	有效	无效	有效率
实验组	33	27 (81.82)	6 (18.18)	0 (0.00)	33 (100.00)
参照组	33	25 (75.76)	2 (6.06)	6 (18.18)	27 (81.82)
χ^2					6.6000
P					0.0102

3 讨论

老年念珠菌性阴道炎是一种比较常见的女性疾病。目前对于老年念珠菌性阴道炎的治疗,主要采用药物治疗的方式。使用药物根据病患疾病的类型进行针对性治疗。目前对于抗菌类药物多为口服药物,但是口服药物无法直达病灶,临床效果慢,副作用大,很多病患会出现胃肠刺激。因此有专家认为,通过采用局部上药的方式能够有效减少老年念珠菌性阴道炎的临床症状,同时能够减少老年念珠菌性阴道炎反复发作。对病患应用克霉唑栓,能够帮助病患恢复阴道内生成状态平衡。同时能够增强阴道免疫功能,提高病患老年念珠菌性阴道炎抗性,酮康唑能够有效对念珠菌有抑制作用。两种药物联合使用,能够有效治疗其疾病。为了验证其临床价值,本次选取我院病患进行调查研究,研究结果显示为:实验组优于参照组,数据对比存在显著差异,再一次验证临床研究结果与文献一致。

综上所述,在对滴虫性老年念珠菌性阴道炎病患进行治疗时,酮康唑与克霉唑栓相结合的治疗方式效果更好,能提高病患的治疗有效率,并缩短病患的治疗时间,此治疗方法值得在临床中推广与应用。

参考文献

- [1]肖明东.酮康唑联合克霉唑栓治疗老年念珠菌性阴道炎病患的临床疗效及安全性分析[J].中国药物经济学,2017,12(04):67-69.
- [2]王宁.氟康唑联合克霉唑栓对老年念珠菌性阴道炎的治疗效果及对病患性生活的影响分析[J].中国医药指南,2019,17(34):169-170.
- [3]陈进军.老年念珠菌性阴道炎采用酮康唑单独及联合克霉唑栓治疗临床效果对比分析[J].基层医学论坛,2018,22(17):2367-2369.